

HASMENÉS?



Tasectan[®]

Hasmenés tüneteinek csökkentésére
gyermekek és felnőttek számára



15 db 500 mg-os kapszula
felnőttek számára



20 db 250 mg-os tasak
gyermekek számára



HASMENÉS?

7- 10 liter Naponta 7-10 liter víz kerül a vékonybélbe

80%-90% Normál bélműködés esetén a víz 80-90 %-át a vékonybél szívja fel

1,5 liter Normál esetben a vékonybél végső szakaszába érkező maximális vízmennyiség

A hasmenés a víz és az elektrolitok felszívódása és kiválasztása között felborult egyensúly miatt alakul ki.

Csökkent felszívódás – megnövekedett kiválasztás



A hasmenés általában a gyomor- és a bélnyálkahártya gyulladás tüneteként jelenik meg.

Kiváltó okai lehetnek:

- ▶ baktérium- vagy vírusfertőzés
- ▶ fertőzött élelmiszerek és víz
- ▶ stressz
- ▶ túlzott alkohol, kávé fogyasztás
- ▶ ételallergia

Tasectan®

Prospektív megfigyeléses vizsgálat Tasectan® kezelésben részesült, akut hasmenés miatt kezelt felnőtt betegeknél¹

Kiindulási érték
100% híg széklet
n=54



...12 óra elteltével
0% híg széklet
n=45



60,9%
normál széklet



39,1%
lágyszéklet

A Tasectan® 12 órán belül kifejtő hatását

Zselatin tannát tartalmú orális szerrel történő kezelés hatékonysága és biztonságossága akut hasmenés miatt kezelt felnőtt betegeknél (n=40)²

Székletcsökkenési index
(Stool Decrease Index, SDI)

Kezelésre reagálók: azok a páciensek, akik a második napon a kiindulási értékhez képest legalább 30%-os csökkenést mutatnak az SDI és a PDI (Pain Decrease Index, fájdalom-csökkenési index) tekintetében.



1. Durbán Reguera F, López-Angüeta Álvarez S, López Montes J, et al. Prospective observational study in adults with acute diarrhoea treated with gelatine tannate. SED Semana de las Enfermedades Digestivas 2007, June 15-19, Madrid, Spain.

2. Allegrini A, Constantini M. Gelatine Tannate for the Treatment of Acute Diarrhoea in Adults. J Gastroint Dig Syst 2012, 2:3

Tasectan®

A probléma helyén fejti ki hatását és helyreállítja a bélnyálkahártya élettani funkcióját¹

Tasectan® 3 hatása

Véd a bélnyálkahártyán bevonatot képezve

Semlegesít megakadályozza a bélfal kórokozókkal történő érintkezését

Kiválaszt és elősegíti azok széklettel történő kiürítését

Tasectan®

- ✓ a hasmenés tüneteinek csökkentésre javallott, vény nélkül kapható orvostechnikai eszköz
- ✓ a probléma helyén fejti ki hatását és a hasmenést kiváltó okot szünteti meg, nemcsak a tüneteket¹
- ✓ a folyadékterápia hatékony kiegészítője³
- ✓ hatékony és biztonságos újszülöttek⁴, gyermekek⁴ és felnőttek² számára

Használat:

- Gyermekek** **3 éves kor alatt:** 1 tasak 6 óránként a tünetek megszűnéséig (gyümölcslebe vagy joghurtba is keverhető)
3-14 éves kor között: 1-2 tasak 6 óránként a tünetek megszűnéséig
- Felnőttek** 1-2 kapszula 4-6 óránként a tünetek megszűnéséig



Forgalmazó: Elva Pharma s.r.o., Dr. Janského 599, 252 28 Cernosice Csehország
Forgalmazó helyi képviselője: Elva Pharma Kft, 4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 5/4.
E-mail: info@elvapharma.com
<http://www.facebook.com/TasectanHu>

A dokumentum lezárásának ideje: 2018. január 15.

3. Carretero et al, A comparative analysis of response to ORS (oral rehydration solution) vs. ORS + gelatine tannate in two cohorts of paediatric patients with acute diarrhoea, Rev. Esp. Enferm. Dig, Vol. 101 No1, pp. 41-48, 2009
4. Durban Reguera F. et al, Prospective observational study on infants and children with acute diarrhoea treated with gelatine tannate. Presented as a poster in the congress "Semana de las Enfermedades Digestivas" in Madrid (Spain), June 2007.